

Állatsereglet a szavannán

Az afrikai szavannák állatai

Nagytestű növényevők


- Sok fű – kedvező élőhely.
- Évszakváltáskor vándorlások-
- A fű kevés tápanyagot biztosít, ezért szinte folyamatosan legelniük kell.
- Patások (párosujjú: pl. antilopok, gnú, bivaly, zsiráf; páratlanujjú: pl. zebrák.)

Antilopok

- Méret a nyúttól a 2 m-esig.
- Növényevők, kérődző (összetett gyomor)
- **Tülkös szarv: a homlokcsont szarvnyúlványára boruló bőr megvastagszik, elszarusodik (tülök).**
- Törzs karcsú, végtagok megnyúltak
- Párosujjú patás.
- **Fogazat hiányos**:
 - szemfog nincs,
 - metszőfog csak az alsó fogsorban.

Redős zápfog.

- *Évente 1 fejlett utód*
Anyjukat szinte rögtön követik.



→ Emésztés menete






- Nagytestű antilopféle
- Több színváltozat, de mindnél a test elején harántcsíkok
- Szőrzete rövid, de a fején, nyakán és farkán hosszabb
- Hátvonala farok felé lejt
- Csordákban él
 - Csorda előnyei: egyed védettebb
- Vándorlás!!!



Zebrák


- 2-2,5 m , 250-500 kg.
- **Páratlanujjú patás.**
- Növényevők, teljes fogazat, redős zápfog.
- **Egyszerű gyomor**, nem kérődzők.
- Szőrzet csíkozottsága fajra jellemző mintázatú.
- Évente 1 fejlett utód.
- Csorda: „őrszemek” – riasztás.



Az oroszlán

- Az oroszlánok *Afrika legnagyobb részén* megtalálhatók . Főleg a fás területeken fordulnak elő, de megtalálhatók a félsivatagos és bozótos helyeken is.
- A ***hímoroszlán*** könnyen felismerhető a sörényéről, a marmagassága kb. 120 cm, a súlya pedig akár a 250 kg-ot is elérheti.
- A ***nőstények*** jóval kisebbek, a felnőtt egyedek marmagassága kb. 100 cm, a súlyuk 150 kg körüli.
- A vadon élő oroszlánok körülbelül 10-14 évig élnek, míg fogságban elérhetik a 20 éves kort is.
- Különálló ***családokban***, azaz **falkában** élnek. A család nagyobb részben nőstényekből, kölykeikből, és egy vagy több egymással rokoni kapcsolatban álló hímből áll.
- A ***hímeket kizárja a falka***, vagy saját maguk hagyják el azt, amikor elérik az ivarérett kort. Amikor új hím veszi át a falka vezetését, gyakran megöl az előző alomból minden kölyköt.

- Egyszerre **1-5 kölyök**. Három hónapig tartó vemhesség. A kölykök 18 hónapon keresztül is szophatnak, de normális esetben 8 hét után leválasztja őket az anyjuk.
- oroszlán is **csúcsragadozó**, ám a többi macskafélétől eltérően csapatban vadászik.
- Leginkább a nőstények vadásznak.
- Nyakra harap, és így kitöri az áldozat nyakát vagy súlyos vérveszteséget okoz. (ragadozó fogazat!!!)
- Általában az első **harapás a hímet** illeti meg, aki a zsákmányt gyakran a falka tagjaitól is agresszívan védi.
- **Dögöket is** fogyaszt. Gyakran elkergeti a kisebb zsákmányejtő ragadozókat vagy azok kisebb csapatait, hogy elvegye prédájukat. Az oroszlánokat is elkergethetik a zsákmánytól az olyan ragadozók, mint a hiénák és a hiénakutyák, ha többen vannak.






© MTV / Europress
www.hirado.hu



Érdeklődőknek



Macskaféle- és a kutyaféle ragadozók

Macskafélék

- Behúzható karmok.
- Látás kitűnő, éjszaka is – fényvisszaverő réteg.
- Hallás kiváló.
- Szaglás jó, de gyengébb a kutyafélékétől.
+ száj-padráson Jacobson-szerv („levegő ízlelése”)
- Édes ízt nem érzik – húsevő specialisták.
→ ízérzékelésük jobb a kutyafélékétől.

Kutyafélék

- Karmok nem behúzhatóak.
- Látás jó, sötétben is . Főleg a mozgást érzékelik jól. (Színeket látnak, de számukra ennek nincs jelentősége.)
- **SZAGLÁS KITŰNŐ!**
„A kutya az orrával gondolkodik.
A kommunikáció legfontosabb közege a szag.”
- Általában a koponya megnyúlt, hegyes orr.
- Édes ízt érzékelik.


•Fogazatuk teljes, szemfogak erős tépőfogak, tarajos zápfogak

•Ragadozók.

•Ujjonjárók

A macskafélék családja

Felidae (macskafélék családja)



A kutyafélék családja

Canidae



Egyéb nemzetségek

Canis nemzetség

Vulpes nemzetség

Dusicyon nemzetség

Faj

sarki róka
lapátfülű kutya
hiénakutya
erdei kutya
nyestkutya
ázsiai vadkutya
sörényes farkas
közönséges pamparóka



Faj

szürke farkas
vörös farkas
prérifarkas
arany sakál
sujtásos sakál
etióp sakál
panyókás sakál
dingó
házikutya



Faj

vörös róka
közönséges szürkeróka
szigeti szürkeróka
prériróka
sivatagi róka
indiai róka
afgán róka
fokföldi róka
pusztai róka
tibeti róka
kitróka
fakóróka
homoki róka



Faj

argentínai pamparóka
deres pamparóka
igazi pamparóka
kisfülű pamparóka
culpeo pamparóka
sechura pamparóka



A foltos hiéna

- **Afrikában** (főleg Kelet-Afrikában) a Szaharától délre a nyílt, füves puszták és bozótosok lakója.
- **Kutyaszerű**. Orra megnyúlt.
- **Sárgás bundáját** sötétebb, ovális foltok pettyezik.
- **Testhossza 95–150 cm, tömege 45–85 kg**. A kifejlett példányok **marmagassága 75-85 cm**.
- **Hátsó lábai rövidebbek** a mellsőknél, ezért háta lejtős, járása koslatós .
- **Gyors és szívós**: hosszú távon képes tartani a **60 km/h** sebességet
- **Élettartama** akár **40 év** is lehet
- Ínséges időszakban a hiéna is kénytelen útra kelni.
- Egyik **legerősebb izomzatú** állat: állkapcsa és fogazata olyan erős, hogy a csontot is képes porrá őrölni.

- **Nőstények nagyobbak** és erősebbek: a különbség átlag 6,6 kg.
- Alapvetően **húsevő**: maga is zsákmányol, de a dögöt sem veti meg. Emellett eszik lárvákat, tojásokat, sőt, gyümölcsöket is.
- Főleg **éjszaka aktív**; ilyenkor csapatban vadászva akár nagyvadakat is elejthet. Csapatban akár a kifejlett nőstény oroszlánt is elejthetik.
- **Klánoknak** nevezett szociális csoportokban élnek; ezek létszáma akár a 100 főt is elérheti. Klánok urai a rokon nőstények Az ivaréretté váló fiatal hímeknek el kell vándorolniuk, és új klánhoz kell csatlakozniuk.
- **Vemhesség** 98-110 nap. Kölykök rendkívül agresszívek. Elválasztás 14-18. héten. Tejük igen tápláló.





VÁZLAT

Állatsereglet a szavannán

1. Antilopok – Csíkos gnú

- a. Gerinces, emlős, párosujjú patás
- b. növényevő - kérődző – összetett gyomor
- c. Tülkös szarv
- d. Vándorlás
- e. Hiányos növényevő fogazat
(metszőfogak csak alul, szemfog nincs, redős zápfog)

2. Zebrák

- a. Gerinces, emlős, páratlanujjú patás
- b. Növényevő – nem kérődző – egyszerű gyomor

3. Oroszlán

- a. Gerinces, emlős, macskaféle, nagymacska
- b. Visszahúzható karom – ujjon járó
- c. Csúcsragadozó
- d. Ragadozó fogazat (metsző-, szem-[tépő-], tarajos zápfogak)